


DISTINGONS LA TRUITELLE DU JEUNE SAUMON (TACON)

Trois caractères doivent être observés en priorité:

1 - LA BOUCHE est plus petite chez le tacon. L'extrémité de la mâchoire ne dépasse pas le milieu de l'œil alors qu'elle atteint l'arrière de l'œil chez la truitelle.

2 - LA NAGEOIRE CAUDALE est très échancrée chez le tacon, peu chez la truitelle.

3 - LA NAGEOIRE ADIPEUSE de bleuâtre à grise chez le tacon, possède une bordure rouge orangée ou brune généralement très visible chez la truitelle.



REMETTONS A L'EAU AVEC DELICATESSE LES TACONS CAPTURES

La compétition entre ces deux salmonidés est faible.

Les truitelles, plus agressives, occupent préférentiellement des secteurs à courant modéré.

Les tacons, dotés de nageoires pectorales davantage développées et d'un corps plus fusiforme, colonisent des secteurs peu profonds, à forte turbulence et courant rapide (radiers).

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
LOIRE GRANDS MIGRATEURS (LOGRAMI) - CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE
ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON - SOS SAUMON LOIRE - ALLIER

Photo Max THIBAUT (INRA Rennes)